

PUELICHE -VTO®

BIOESTIMULANTE

POLVO MOJABLE (WP)

PUELICHE-VTO® es un bioestimulante en base a *Trichoderma* spp. y *Bacillus* spp. lo que logra un producto con gran poder de secado, alta efectividad y rapidez de cobertura.

COMPOSICIÓN

| | (% p/p) |
|-------------------------|-------------------|
| <i>Trichoderma</i> spp. | 0,6% p/p (6 g/Kg) |
| <i>Bacillus</i> spp. | 0,9% p/p (9 g/Kg) |
| Coformulantes c.s.p. | 100% p/p (1 Kg) |

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA

Parcela Antilhue Lote 4 B2. Maule, Chile Fono: +56-71-2970696
Casilla 6 Maule/ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl

© Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

Importado por:

Bio Insumos Nativa Perú

Calle Las Palmeras N° 331 Depto. 303
San Isidro- Lima - Perú

Distribuido por:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERÚ

Calle Coronel Andres Reyes N° 360 Of. 401 -A.
San Isidro- Lima 27 - Perú
Teléfono: (511) 444-3096



Lote:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Cantidad:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para su seguridad en la preparación y durante la aplicación: evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Utilizar ropa protectora adecuada para la labor.

Para su seguridad después de la aplicación: lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a utilizarla.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INGESTION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO ES TÓXICO A ORGANISMOS ACUÁTICOS, PECES, AVES, ANIMALES NI ABEJAS.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

FONO: +56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS

FONO: +56-2-22473600

ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

BIO INSUMOS NATIVA SPA: +56 -71- 2970696/2970698

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Generalidades: Las cepas de *Trichoderma* spp. y *Bacillus* spp. promueven la estimulación natural del crecimiento de las plantas, activando el desarrollo del área vegetativa. Su aplicación preventiva ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés tanto de origen biótico y abiótico.

Cuadro Instrucciones de Uso

| CULTIVO | DOSIS (g /hl) | OBSERVACIONES |
|--------------------|---------------|---|
| Vid | 100 - 150 | Aplicación en Pre flor, flor, post flor, apriete, pinta, pre cosecha, con mojamientos de 1.000-2.000 L. |
| Arándano | 100 - 150 | Aplicación en cuaja, pinta, pre cosecha y cosecha, con mojamientos de 500-1.000 L. |
| Carozos | 100 | Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha, con mojamientos de 1.000-2.000 L. |
| Tomate | 100 | Aplicación en almacigo, trasplante, post trasplante con mojamientos de 400 - 1000 L. |
| Palto | 100 - 150 | Aplicación a inicio de flor, 50% flor, cuaja, pre cosecha y cosecha con mojamientos de 1.000-2.000 L. |
| Manzano | 100 - 150 | Aplicación en Pre flor, flor, cuaja y estado T, con mojamientos de 1.000-2.000 L. |
| Cítrico | 100 - 150 | Aplicación en inicio flor, 50% flor, cuaja, precosecha, con mojamientos de 1.000-3.000 L. |
| Granado | 100 | Aplicación en floración, con mojamientos de 1.000-1.500 L. |
| Esparrago | 100 | Aplicación en emisión de turiones, repetir hasta cosecha, mojamientos de 200 - 500 L. |
| Cebolla y capsicum | 150 | Aplicación desde almacigo a cosecha, aplicaciones foliares cada 15 días, con mojamientos de 300-600 L. |

Preparación de la mezcla: Diluir en un recipiente con agua, la cantidad necesaria de **PUELICHE-VTO®**, agitando fuertemente; luego dejar decantar por unos minutos, antes de verter en el equipo de aplicación, que previamente ha sido llenado con agua hasta completar el nivel necesario para la aplicación. La utilización de la mezcla debe hacerse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación constante.

Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **PUELICHE - VTO®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Almacenaje: **PUELICHE - VTO®** debe ser almacenado en su envase original sellado, en un ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 12 meses.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Período de Carencia: No tiene.

Tiempo de Reingreso al área tratada: No posee restricciones para el reingreso a el área tratada.