
FICHA TÉCNICA

BIOMONGEN® (SC) **FUNGICIDA BIOLOGICO**

BIOMONGEN® es un fungicida biológico compuesto por cepas nativas de los biocontroladores *Trichoderma* spp. Posee acción sobre hongos del suelo según cuadro de instrucciones de uso.

Las cepas de *Trichoderma* spp., poseen acción fungicida a través de mecanismos de competencia e inhibición; contra hongos fitopatógenos como *Fusarium moniliforme* en maíz. Posee amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas, tal como se observa en el cuadro "Instrucciones de uso".

La formulación de **BIOMONGEN®** está compuesta por micelios y conidias de los hongos biocontroladores, que presentan excelente resistencia a las condiciones ambientales donde se desarrollan los cultivos.

Registro SAG N° 2.946-O.

Autorizado por SAG para su uso en agricultura orgánica nacional.

Formulación

<i>Trichoderma virens</i> cepa Chagual	5.535% p/v (55.35 g/l)
<i>Hypocrea lixi</i> cepa Quintral	5.535% p/v (55.35 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v (1 L)
Contiene una concentración de suma de cepas de 1×10^9 UFC/ml.	



INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Patógenos	Dosis	Épocas de Aplicación
Maíz	Fusarium moniliforme	300 cc/100 kg (semilla)	Siembra: Aplicar sobre semillas secas antes de sembrar. Mezclar en forma homogénea con el producto para obtener un óptimo cubrimiento.
		300 cc/ha	Emergencia: Dirigir la aspersión dando cobertura a la zona del cuello de la planta. Se recomienda un volumen de mojamiento de 400 l/ha. Realizar una aplicación para cada etapa descrita, por temporada.

Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con algunos productos agroquímicos. No mezclar **Biomongen®** con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Periodo de carencia: No corresponde.

Tiempo de reingreso al área tratada: Es posible reingresar 2 horas después de la aplicación, en el caso de seres humanos. En animales, no corresponde, ya que estos cultivos no son de consumo animal.

Almacenamiento: **BIOMONGEN®**, puede ser almacenado durante 30 días a temperatura ambiente y 90 días almacenado a 4° C. Mantenga en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Uso en Agricultura orgánica:

**Producto apto para su uso en Agricultura Ecológica de acuerdo con: Reglamento
NOP y el Reglamento JAS.
Control ECOCERT F-32600.**



Autorizado por SAG para su uso en agricultura orgánica nacional

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONO: +56-2-22473600 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71) 2970696/2970698.