

FICHA TÉCNICA

CENTEON MAX® (SC)

(Formulación SC)

Bioestimulante de planta microbiano
Suspensión Concentrada (SC)

CENTEON MAX® SC es un bioestimulante biológico compuesto por *Trichoderma virens* y *Bacillus subtilis*, formulado en suspensión concentrada con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas, mejorando el desarrollo vegetativo. Activa el desarrollo de raíces. Su aplicación ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas.

Visado por S.A.G. para Uso en Agricultura Orgánica Nacional

Formulación:

COMPOSICIÓN

Trichoderma virens cepa Liuto
Bacillus subtilis cepa N5
Coformulantes c.s.p

7 * 10⁷ UFC/ml
3 * 10⁷ UFC/ml
94% p/v (964g/L)

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Época de aplicación
Berries	1 a 2 L/ha (Dosis mínima de 200 cc/100 L agua)	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha a través de riego o aspersión al suelo.
Frutales y Vides	1,5 a 2 L/ha(500 ml/100 L de agua)	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha a través de riego o aspersión al suelo
Cultivos	1,5 a 2 L/ha	Aplicar desde siembra a cosecha al suelo mediante aspersión.
Hortalizas	2 a 5 cc/L de agua	En almácigo aplicaciones desde siembra a trasplante.
	1 a 2 L/ha	Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.
Forestales	2 a 5 cc/L de agua	Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante.
	1 a 2 L/ha	Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.
Flores y Ornamentales	2 a 5 cc/L de agua	Aplicación en vivero desde siembra a trasplante.
	1 a 2 L/ha	Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.

Número de aplicaciones: No existe límite en el número de aplicaciones por temporada.

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Forma de aplicación: Aplicar vía riego o drenching. Utilizar un volumen de mojado que permita el correcto cubrimiento de las plantas, sin provocar escurrimiento de la mezcla.

Compatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **CENTEON MAX® SC** con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Almacenaje: Puede ser almacenado a temperatura ambiente por un máximo de 30 días. Su duración puede extenderse hasta 90 días almacenado a 4°C. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.

Uso en agricultura orgánica:

Producto apto para su uso en Agricultura Ecológica de acuerdo con: Reglamentos (UE) nº 2018/848 y 2021/1165, el Reglamento NOP y el Reglamento JAS.
Control ECOCERT F-32600.



Producto apto para su uso en la Agricultura orgánica de acuerdo con el reglamento
KIWA BCS.

Visado por S.A.G. para Uso en Agricultura Orgánica Nacional

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800
CITUC EMERGENCIAS
QUIMICAS FONO: +56-2-22473600 ATENCIÓN LAS 24 HORAS
BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71) 2970696/2970698.

Lote:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento: