

## FICHA TÉCNICA

### **CENTEON MAX®** **(Formulación WP)**

Bioestimulante de planta microbiano.  
Polvo mojable (WP)

**CENTEON MAX® WP** es un bioestimulante biológico compuesto por *Trichoderma virens* y *Bacillus subtilis*, formulado en polvo mojable con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas, mejorando el desarrollo vegetativo. Activa el desarrollo de raíces. Su aplicación ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas.

**Visado por S.A.G. para Uso en Agricultura Orgánica Nacional**

#### **Formulación:**

#### **COMPOSICIÓN**

**(% p/p)**

*Trichoderma virens* cepa Luito  
*Bacillus subtilis* cepa N5  
Coformulantes c.s.p.

7 \* 10<sup>7</sup> UFC/g  
3 \* 10<sup>7</sup> UFC/g  
94% p/p (940 g/ kg)

## INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO                                | DOSIS                                                      | ÉPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berries                                | 1 a 2 kg/ha<br>(200 g/100 L de agua para uso en drenching) | Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 - 5 g/planta como espolvoreo. |
| Frutales y Vides                       | 1,5 a 2 kg/ha (500 g/100 L de agua para uso en drenching)  | Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 - 5 g/planta como espolvoreo. |
| Cultivos (Cereales; Oleaginosas; Papa) | 1 a 2 kg/ha                                                | Aplicar desde siembra a cosecha al suelo mediante aspersión.                                                                                                                                                                                                                                |
| Hortalizas                             | 2 a 5 g/L de agua                                          | En almácigo aplicaciones desde siembra a trasplante.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | 1 a 2 kg/ha                                                | Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.                                                                                                                                  |
| Forestales                             | 2 a 5 g/L de agua                                          | Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | 1 a 2 kg/ha                                                | Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.                                                                                                                                  |
| Flores y Ornamentales                  | 2 a 5 g/L de agua                                          | Aplicación en vivero desde siembra a trasplante.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | 1 a 2 kg/ha                                                | Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.                                                                                                                                  |

**Número de aplicaciones:** No existe límite en el número de aplicaciones por temporada

**Preparación de la mezcla:** Agitar en un balde con poca agua la cantidad necesaria de **CENTEON MAX® WP** a utilizar. Llenar el estanque de la bomba hasta la mitad con agua. Vaciar el contenido del balde al estanque y completar el volumen de agua revolviendo.

**Forma de aplicación:** Aplicar vía riego o drenching. Utilizar un volumen de mojado que permita el correcto cubrimiento de plantas, suelo y/o sustrato.

**Compatibilidad:** Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **CENTEON MAX® WP** con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**Almacenaje:** Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 15 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

**Período de Carencia:** No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.

#### Uso en agricultura orgánica:

**Producto apto para su uso en Agricultura Ecológica de acuerdo con: Reglamentos (UE) nº 2018/848 y 2021/1165, Reglamento NOP y el Reglamento JAS.  
Control ECOCERT F-32600**



**Se encuentra en la OMRI Listed®.  
Visado por S.A.G. para Uso en Agricultura Orgánica Nacional**

Lote:  
Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:

**nativa**

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: B I O I N S U M O S**  
**CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800**  
**CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONO: +56-2-22473600 -**  
**ATENCIÓN LAS 24 HORAS BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71)**  
**2970696/2970698.**