

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Fungicida biológico con base en conidias y micelios de la cepa Queule del hongo *Trichoderma harzianum*, la cepa Trailes del hongo *Trichoderma parceramosum*.

Para su seguridad durante la preparación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes y overol impermeables, botas de gomo, protector facial y mascarilla para polvos.

Para su seguridad durante la aplicación: Evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Use guantes y overol impermeables, botas de gomo, protector facial y mascarilla. Aleje animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto, no aplique con viento ni lluvia en las pulverizaciones foliares.

Para su seguridad después de la aplicación: Lávese después del trabajo y antes de comer, cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

Instrucciones para el Triple Lavado: Vacíe el contenido del envase en el estanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos. Adicione agua limpia al envase, hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Luego vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Los envases deben ser lavados al menos 3 veces en forma sucesiva. Por último, perforo el envase para evitar su reutilización y elimine los envases de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes.

Síntomas de Intoxicación: En caso de ingestión posible diarrea, en caso de contacto con piel u ojos, posible irritación.

Primeros Auxilios: En caso de contacto con los ojos; lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de contacto con la piel; retirar ropa y zapatos. Lavar la piel con abundante agua limpia, asegurándose de hacerlo minuciosamente entre el cabello, las uñas y los pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si existe irritación, acudir a un médico.

En caso de ingestión; no inducir vómitos, avisar y mostrar la etiqueta a un médico. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación; Trasladar al afectado al aire fresco, avisar y mostrar la etiqueta a un médico. Si la persona no respira otorgar respiración artificial.

Tratamiento médico de emergencia: No requiere tratamiento médico de emergencia, solo tratamiento sintomático.

Antídoto; No posee antídoto específico, se debe tratar sintomáticamente.

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE” MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEB DESTINADOS AL USO DE CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico a organismos acuáticos, peces, aves y animales. **Virtualmente no tóxico para abejas.**

Almacenaje: *Trichonativa*[®] debe ser almacenado a 4°C por un máximo de 3 meses y 1 mes a temperatura ambiente. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

Teléfonos de Emergencia: CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONOS: +56-2-26353800,

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONOS: +56-2-22473600 – ATENCIÓN LAS 24 HORAS.

Bio Insumos Nativa SpA. Fono: +56-71-2970696.

TRICHONATIVA[®] FUNGICIDA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Trichonativa[®] es un fungicida biológico con base en *Trichoderma spp.*, en suspensión concentrada 1x10⁹ UFC/ml, con un amplio espectro de acción sobre los hongos indicados en el cuadro de instrucciones, actuando por competencia, antibiosis y depredación. Presentando efecto estimulante de crecimiento en los cultivos indicados.

COMPOSICIÓN

<i>Trichoderma harzianum</i> cepa Queule*	1,217% p/v (12,17% g/L = 12,17 g/kg)
<i>Trichoderma virens</i> cepa Sherwood*	1,217% p/v (12,17% g/L = 12,17 g/kg)
<i>Trichoderma parceramosum</i> cepa Trailes*	1,217% p/v (12,17% g/L = 12,17 g/kg)
Coformulantes c.s.p	100% p/v (1 L)

*Cada cepa contiene una concentración de 3,3x10⁸ UFC/ml. Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°2.587-O.



Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA.

Parcela Antihue Lote 4B-2, Maule, Chile.

Fono: +56-71-2970696

ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl


©Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA.

Número de Lote:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO



CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO
AUTORIZADO PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

Generalidades: Las cepas de **Trichonativa®**, utilizadas presentan acción fungicida a través de competencia, antibiosis y depredación de hongos fitopatógenos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cultivo	Enfermedad / Patógeno	Dosis	Observaciones
Manzano	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/hL	Aplicación (<i>Botrytis</i> y <i>Alternaria</i>) con 5% de flor, plena flor y caída de pétalos (3 aplicaciones), con mojamiento de 1000 – 2000 L/ha.
	Corazón Mohoso (<i>Alternaria alternata</i>)		Aplicar en brotación y postcosecha, a través de riego o aspersión al suelo (2 aplicaciones en la temporada). Utilizar la dosis menor en plantaciones sin síntomas y la mayor en plantaciones con síntomas.
Frutales Manzano, Peral, Cerezo, Durazno, Nogal y Avellano, Palto, Olivo, Cítricos (Naranja, Mandarino, Limonero y Pomelo)	Podrición de raíces y cuello (<i>Phytophthora cactorum</i> , <i>P. citricola</i> , <i>P. drechsleri</i> , <i>P. megasperma</i> , <i>P. citrophthora</i> , <i>P. cinnamomi</i> , <i>P. nicotianae</i> , <i>P. cryptogea</i>)	1.5 – 2 L/ha	Aplicar en brotación y postcosecha, a través de riego o aspersión al suelo (2 aplicaciones en la temporada). Utilizar la dosis menor en plantaciones sin síntomas y la mayor en plantaciones con síntomas.
		5 ml/L	Inmersión de la totalidad de raíces en el momento de trasplante por 2 minutos.
			Aplicaciones curativas: Inyección al suelo con 5 ml/L, con volumen suficiente de mezcla para cubrir volumen de raíces.
Cerezo	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 ml/hL	Aplicar en plena flor, fruto cuajado y 5 días precosecha, a través de aspersión, con mojamientos de 1000 a 1500 L/ha. Se recomienda mínimo 2 aplicaciones por temporada.
Vid	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 ml/hL	Aspersión foliar en pre-flor, fin de flor, apriete racimo y pinta (4 aplicaciones) y luego en base a condiciones predisponentes (máximo 2 aplicaciones). Utilizando la dosis menor en sistema de conducción de espaldera y la dosis mayor en parronales. Se recomienda un máximo de 6 aplicaciones por temporada, con mojamientos de 1000 a 1200 L/ha.
Frambueso, Frutilla, Arándano	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 ml/hL	Aplicación foliar según condiciones (máximo 4 aplicaciones), desde floración, cada 7 días, con un volumen mínimo de 400 L/ha.
	Podrición de raíces y cuello (<i>Phytophthora fragariae</i> , <i>P. citricola</i> , <i>P. citrophthora</i> , <i>P. megasperma</i> , <i>P. cryptogea</i> , <i>P. cactorum</i>) Podredumbre blanca (<i>Armillaria mellea</i>)	1.5 L/ha	Aplicación al suelo por riego o drenching en peak de crecimiento de raíces y plena temporada (máximo 3 aplicaciones por temporada).
Arándano	Enfermedades de la madera (<i>Fusicoccum</i> sp.)	100 ml/hL	Aplicaciones por aspersión a el follaje en caída de hojas, receso y brotación. Máximo 3 aplicaciones por temporada, utilizar mojamientos de 200 a 600 L/ha.
	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 ml/hL 100 – 300 ml/hL	Aplicación a través de aspersión previo a floración, con mojamientos de 1000 L/ha. Se recomienda 1 aplicación por temporada. Aplicación en línea de selección y embalaje, se recomienda la dosis de 100 ml/hL para baja incidencia de la enfermedad y la dosis de 300 ml/hL para una alta incidencia de la enfermedad.
Granado	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 - 2 L/ha ó 150 ml/hL	Aplicación foliar con 50% de floración, cuaja y en precosecha (1 o 2 días antes de cosecha). Utilizar la dosis menor con mojamientos de hasta 1000 L/ha y dosis mayor con mojamientos mayores.
Kiwi	Verticilosis (<i>Verticillium albo-atrum</i>)	10ml/L ó 2 L/ha	Inmersión de raíces antes de plantación, con dosis de 10 ml/L por 2 minutos. Post plantación aplicación por drenching 2 L/ha, con volúmenes de 5 L mezcla por planta y luego en primer riego 2 L/ha. Se recomienda máximo 2 aplicaciones por temporada.
	Podrición blanca (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	150 ml/hL	Aplicación previa a la cosecha a través de aspersión con mojamientos de 1500 L/ha.
	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 ml/hL	Aplicación previa a la cosecha a través de aspersión con mojamientos de 1500 L/ha.
	Enfermedades de la madera (<i>Chondrostereum purpureum</i>)	100 ml/hL	Aplicaciones enfermedades de la madera inmediatamente posterior a poda y con una segunda aplicación opcional en floración, con mojamientos de 1000-1500 L/ha según estado fenológico. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por temporada.
Mora, Mora híbrida, Cranberry, Maqui, Zarparrilla, Murtilla y Goldenberry.	Podrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	200 ml/hL	Aplicación foliar según condiciones (máximo 4 aplicaciones), desde floración, cada 7 días, con un volumen mínimo de 400 L/ha.
	Podrición de raíces y cuello (<i>Phytophthora fragariae</i> , <i>P. citricola</i> , <i>P. citrophthora</i> , <i>P. megasperma</i> , <i>P. cryptogea</i> , <i>P. cactorum</i>)	1.5 L/ha	Aplicación al suelo por riego o drenching en peak de crecimiento de raíces y plena temporada (máximo 3 aplicaciones por temporada)

Preparación de la mezcla: Agitar fuertemente el envase antes de usar. Lenar el equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad necesaria de **Trichonativa®**, agitar fuertemente y luego complementar con la cantidad de agua deseada. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Incompatibilidad: **Trichonativa®** No es compatible con fungicidas recomendados para Fusariosis, *Bacillus thuringiensis* o *Bacillus subtilis*.

Fitotoxicidad: **Trichonativa®** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados. No aplicar este producto sobre cultivos de hongos comestibles o sustratos a utilizar en estos. No aplicar en recintos cerrados con presencia de estos cultivos. Al aire libre se recomienda aplicar a una distancia de 20 metros de cada cultivo de hongo comestible o sustrato a utilizar en estos. **Periodo de carencia:** No tiene días de carencia. **Tiempo de reingreso al área tratada:** Es posible reingresar 2 horas después de la aplicación, una vez que se ha secado el depósito sobre el follaje, en el caso de personas. En animales, no corresponde, ya que estos cultivos no son de consumo animal.

